



**Comuni del Piano di Monitoraggio
FLAVESCENZA DORATA**

**Progetto MOSCATO CUNEESE – VALLI BELBO, TINELLA e BORMIDA
(COMUNICATO VALIDO PER I SEGUENTI COMUNI: Alba, Castiglione T. , Castino, Cossano B. , Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta B., Santo Stefano B., Treiso, Trezzo Tinella)**

**TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2022
contro *Scaphoideus titanus***

ATTENZIONE: in alcune aree c'è un aumento importante della malattia; è NECESSARIO dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) eliminare i tralci con sintomi o capitozzare le viti malate senza attendere la vendemmia: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).

**Secondo trattamento insetticida per le aziende convenzionali:
dal 24 al 29 luglio 2022**

AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020) Acetamiprid, Acrinatrina, Etofenprox, Flupyradifurone, Sulfoxaflor, Tau-Fluvalinate
Deltametrina (deroga del 06/07/2022 prot. n. 17150/A1703B)

**ALTRE AZIENDE: PER IL SECONDO TRATTAMENTO
PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE:**

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Acetamiprid	Neonicotinoidi	7-14
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	21
Flupyradifurone	Butenolidi	14
Sulfoxaflor	Sulfoximine	7
Varie	Piretroidi	vari

Salvaguardia degli insetti pronubi (Legge regionale 22/01/2019, n. 1)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- **Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.**
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione.
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Per i vigneti situati a distanze tra i 10 e i 30 metri (sotto i 10 metri non sono possibili trattamenti) da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.